


DIE TIGERMÜCKE

VERMEHRT SICH SEHR SCHNELL

Pro Weibchen bis zu 100 Eier

Wenige Wochen später kann jedes neue Weibchen erneut bis zu 100 Eier legen.



- 1 Mückenweibchen können bereits nach einer Blutmahlzeit Eier legen.
- 2 Entwicklung innerhalb weniger Tage bis Wochen. Je wärmer es ist, desto schneller entwickeln sich die Mückenlarven.
- 3 Population wächst exponentiell, kann jedoch durch Ihre Mithilfe reduziert werden.

FRÜHE MITHILFE DER BÜRGER NOTWENDIG
→ **MASSNAHMEN SIEHE RÜCKSEITE**

DIE TIGERMÜCKE

TAGAKTIV UND AGGRESSIV

STECKBRIEF

Asiatische Tigermücke

- Schwarz-weiß gestreift, mit weißen länglichen Streifen auf der Brust
- Tagaktiv
- Aggressiv
- Eier sind beständig gegen Kälte und Trockenheit
- Übertragung von tropischen Krankheiten möglich



Larven

- 2-10 mm, wurmartig
- Schlängelnde Bewegung
- An der Wasseroberfläche hängend



HILFE ZUR SELBSTHILFE

ENDLICH EINE EFFEKTIVE LÖSUNG GEGEN TIGERMÜCKEN

Für den Privatgebrauch



Herausgeber:
Biogents AG
An der Irlter Höhe 3a
93055 Regensburg
Germany

Anfrage:
E-Mail: tigermuecke@biogents.com
Web: eu.biogents.com

Presseanfragen:
biogents@seidl-agentur.com



HILFE ZUR SELBSTHILFE NACHHALTIGE TIGERMÜCKENBEKÄMPFUNG IM ERWACHSENEN- UND LARVENSTADIUM

MÜCKENFALLEN AUFSTELLEN



Biogents Mückenfallen aufstellen

Im Gebüsch, mit ausreichend Abstand zum Menschen platzieren und regelmäßig kontrollieren



Anwendung im Zeitraum

von April / Mai bis September / Oktober für nachhaltige Schutzwirkung



Lokale Schutzwirkung

bis zu 300 qm

MÜCKENFALLE GEGEN STICHE

Biogents Mückenfallen imitieren einen Menschen, um Stiche zu reduzieren. So verhindern sie die Übertragung von Krankheiten.



TIGERMÜCKENFALLE GEGEN EIABLAGE

Biogents Tigermückenfallen imitieren eine Brutstätte, um die Vermehrung von Tigermücken zu stoppen. So verhindern sie exponentielles Wachstum.



BIS ZU 87 %
WENIGER STICHE



INSEKTIZID-
FREI



WISSENSCHAFTLICH
ERWIESEN

ERWACHSENEN-
STADIUM


EI

Die Eier werden knapp oberhalb der Wasseroberfläche abgelegt. Sie werden auf mehrere Brutstätten verteilt.

MÖGLICHE BRUTSTÄTTEN KONTROLLIEREN UND LEEREN

Als Brutplätze dienen z. B.:

- Regentonnen
- Blumentöpfe
- Teelichter
- Gießkannen
- Schubkarren



PUPPEN

LARVEN-
STADIUM

Die Larven schlüpfen, sobald die Eier mit Wasser bedeckt sind.

MÖGLICHE BRUTSTÄTTEN IM VORFELD VERMEIDEN UND ENTFERNEN

- Blumentopfuntersetzer mit Kies befüllen
- Gießkannen aufhängen
- Regentonnen abdecken



NICHT VERMEIDBARE BRUTSTÄTTEN MIT LARVIZIDEN BEKÄMPFEN