


# DIE TIGERMÜCKE VERMEHRT SICH SEHR SCHNELL

Pro Weibchen bis zu 100 Eier

Wenige Wochen später kann jedes neue Weibchen erneut bis zu 100 Eier legen.



- 1 Mückenweibchen können bereits nach einer Blutmahlzeit Eier legen.
- 2 Entwicklung innerhalb weniger Tage bis Wochen. Je wärmer es ist, desto schneller entwickeln sich die Mückenlarven.
- 3 Population wächst exponentiell, kann jedoch durch Ihre Mithilfe reduziert werden.

**FRÜHE MITHILFE DER BÜRGER NOTWENDIG**  
→ **MASSNAHMEN SIEHE RÜCKSEITE**

## DIE TIGERMÜCKE TAGAKTIV UND AGGRESSIV

### STECKBRIEF

#### Asiatische Tigermücke

- Schwarz-weiß gestreift, mit weißen länglichen Streifen auf der Brust
- Tagaktiv
- Aggressiv
- Eier sind beständig gegen Kälte und Trockenheit
- Übertragung von tropischen Krankheiten möglich

#### Larven

- 2-10 mm, wurmartig
- Schlängelnde Bewegung
- An der Wasseroberfläche hängend



## HILFE ZUR SELBSTHILFE ENDLICH EINE EFFEKTIVE LÖSUNG GEGEN TIGERMÜCKEN

Für den Privatgebrauch



**Herausgeber:**  
Biogents AG  
An der Irlter Höhe 3a  
93055 Regensburg  
Germany

**Anfrage:**  
E-Mail: [tigermuecke@biogents.com](mailto:tigermuecke@biogents.com)  
Web: [eu.biogents.com](http://eu.biogents.com)

**Presseanfragen:**  
[biogents@seidl-agentur.com](mailto:biogents@seidl-agentur.com)



# HILFE ZUR SELBSTHILFE NACHHALTIGE TIGERMÜCKENBEKÄMPFUNG IM ERWACHSENEN- UND LARVENSTADIUM

## MÜCKENFALLEN AUFSTELLEN



### Biogents Mückenfallen aufstellen

Im Gebüsch, mit ausreichend Abstand zum Menschen platzieren und regelmäßig kontrollieren



### Anwendung im Zeitraum

von April / Mai bis September / Oktober für nachhaltige Schutzwirkung



### Lokale Schutzwirkung

bis zu 300 qm

## MÜCKENFALLE GEGEN STICHE

Biogents Mückenfallen imitieren einen Menschen, um Stiche zu reduzieren. So verhindern sie die Übertragung von Krankheiten.



## TIGERMÜCKENFALLE GEGEN EIABLAGE

Biogents Tigermückenfallen imitieren eine Brutstätte, um die Vermehrung von Tigermücken zu stoppen. So verhindern sie exponentielles Wachstum.



BIS ZU 87%  
WENIGER STICHE



INSEKTIZID-  
FREI



WISSENSCHAFTLICH  
ERWIESEN

ERWACHSENEN-  
STADIUM


Ei

Die Eier werden knapp oberhalb der Wasseroberfläche abgelegt. Sie werden auf mehrere Brutstätten verteilt.

## MÖGLICHE BRUTSTÄTTEN KONTROLLIEREN UND LEEREN

Als Brutplätze dienen z. B.:

- Regentonnen
- Blumentöpfe
- Teelichter
- Gießkannen
- Schubkarren




PUPPEN

LARVEN-  
STADIUM

Die Larven schlüpfen, sobald die Eier mit Wasser bedeckt sind.

## MÖGLICHE BRUTSTÄTTEN IM VORFELD VERMEIDEN UND ENTFERNEN

- Blumentopfuntersetzer mit Kies befüllen
- Gießkannen aufhängen
- Regentonnen abdecken



## NICHT VERMEIDBARE BRUTSTÄTTEN MIT LARVIZIDEN BEKÄMPFEN